


Smoothed Percentiles of Birth Weight (g) for
 Gestational Age: U. S. 1991 Single Live Births to
 Resident Mothers

Gestational Age (wk)	5th Pctl	10th Pctl	50th Pctl	90th Pctl	95th Pctl
20	249	275	412	772	912
21	280	314	433	790	957
22	330	376	496	826	1023
23	385	440	582	882	1107
24	435	498	674	977	1223
25	480	558	779	1138	1397
26	529	625	899	1362	1640
27	591	702	1035	1635	1927
28	670	798	1196	1977	2237
29	772	925	1394	2361	2553
30	910	1085	1637	2710	2847
31	1088	1278	1918	2986	3108
32	1294	1495	2203	3200	3338
33	1513	1725	2458	3370	3536
34	1795	1950	2667	3502	3697
35	1950	2159	2831	3596	3812
36	2156	2354	2974	3668	3888
37	2357	2541	3117	3755	3956
38	2543	2714	3263	3865	4027
39	2685	2852	3400	3980	4107
40	2761	2929	3495	4060	4185
41	2777	2948	3527	4094	4217
42	2764	2935	3522	4098	4213
43	2741	2907	3505	4096	4178
44	2724	2885	3491	4096	4122



Lurva de crescimento fetal

Alexander et al.

Obstetrics & Gynecology, 1996

Parâmetros da tabela de avaliação da IG conforme Capurro e cols.

Cálculo da idade gestacional

Método de Capurro

Exame somático e neurológico

Textura da pele	0	5	10	15	20
Forma da orelha	0	8	16	24	
Nódulo mamário	0	5	10	15	
Pregas plantares	0	5	10	15	20
Sinal de cachecol	0	6	12	18	
Posição de cabeça ao levantar o RN	0	4	8	12	

K = 200

IG calculada = K + somatória dos pontos/7 = semanas de gestação

Exame somático

Textura da pele	0	5	10	15	20
Forma da orelha	0	8	16	24	
Nódulo mamário	0	5	10	15	
Pregas plantares	0	5	10	15	20
Formação do mamilo	0	5	10	15	

K = 204

IG calculada = K + somatória dos pontos/7 = semanas de gestação

Textura da pele

- 0 – Muito fina, gelatinosa
- 5 – Fina e lisa
- 10 – Algo mais grossa, discreta descamação superficial
- 15 – Grossa, marcas superficiais, descamação nas mãos
- 20 – Grossa, enrugada, com marcas profundas

Forma da orelha

- 0 – Chata, disforme, pavilhão não encurvado
- 8 – Pavilhão parcialmente encurvado na borda
- 16 – Pavilhão parcialmente encurvado em toda a parte superior
- 24 – Pavilhão totalmente encurvado

Nódulo mamário

- 0 – Não palpável
- 5 – Palpável, menor que 5mm
- 10 – Entre 5 e 10mm
- 15 – Maior que 10mm

Formação do mamilo

- 0 – Apenas visível
- 5 – Aréola visível com discreta pigmentação – diâmetro < 0,75cm
- 10 – Aréola pigmentada com borda visível não levantada – diâmetro < 0,75cm
- 15 – Aréola pigmentada com borda saliente – diâmetro > 0,75cm

Pregas plantares

- 0 – Sem pregas
- 5 – Marcas mal definidas sobre a parte anterior da planta
- 10 – Marcas bem definidas sobre a metade anterior e sulcos no terço anterior
- 15 – Sulcos na metade anterior da planta
- 20 – Sulcos em mais da metade anterior da planta

Sinal do cachecol

- 0 – O cotovelo alcança a linha axilar anterior do lado oposto
- 6 – O cotovelo situado entre a linha axilar anterior do lado oposto e a linha média
- 12 – O cotovelo situado ao nível da linha média
- 18 – O cotovelo situado entre a linha média e a linha axilar anterior do mesmo lado

Posição da cabeça ao levantar o RN

- 0 – Cabeça totalmente deflexionada, ângulo torácico 270°
- 4 – Ângulo cervicotorácico entre 180° e 270°
- 8 – Ângulo cervicotorácico igual a 180°
- 12 – Ângulo cervicotorácico menor que 180°